

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES CON EII SOBRE COVID-19



Esta encuesta ha sido **diseñada conjuntamente con Pr. Silvio Danese, Jefe del Centro de EII en el Hospital Universitario Humanitas de Milán**, para comprender mejor las preocupaciones y los temores de la comunidad de EII en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Los datos se recopilaron entre el 30 de marzo y el 24 de abril.

Argentina – Country Profile




En Argentina con la colaboración de



FUNDACIÓN
MAS VIDA
CROHN & COLITIS ULCEROSA



VISIÓN GENERAL



24% Enfermedad de Crohn
 69% Colitis Ulcerosa
 7% Colitis Indeterminada



33% Empleo privado
 19% Empleo público
 15% Estudiante
 22% Empleo por cuenta propia
 6% Desempleado
 5% Retirado

87 PARTICIPANTES:



74% Femenino
 26% Masculino



36 años edad promedio



38% Vive con niños



15% Vive con ancianos



2018 año promedio de diagnóstico

Pandemia de COVID-19 en Argentina - Datos principales durante la recopilación de datos

La pandemia de COVID-19 en Argentina es parte de la pandemia mundial de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).

El **3 Marzo 2020**, se confirmó que el virus se había extendido a Argentina..

19 Marzo: el Presidente Alberto Fernández anunció un cierre obligatorio, desde la medianoche del 20 de marzo hasta el 31 de marzo.

8 April: el Presidente Alberto Fernández anunció que el cierre obligatorio se prolongaría más allá del 12 de abril, con la "flexibilización" de pocas actividades solamente.

10 April: el Presidente Fernández confirmó que el bloqueo se prolongaría hasta el 26 de abril en las principales ciudades y que se analizaría la flexibilización de las restricciones en zonas con menor riesgo.

13 April: después de la aparición de tres casos asintomáticos, las autoridades de Buenos Aires introdujeron el enmascaramiento obligatorio a partir del 14 de abril. El uso de una máscara facial se hizo obligatorio para todos en el transporte público y para todos los que contactan con el público en su posición.

16 April: en este día, el Ministerio de Salud confirmó 98 casos nuevos y 10 muertes, lo que elevó el número total de casos confirmados a 2,658 y el número de muertos a 122 víctimas fatales.


Fuente: Wikipedia





VISIÓN GENERAL

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR PAÍS



N=87




PENSAMIENTOS GENERALES

¿LA TRANSMISIÓN RESPIRATORIA ES LA ÚNICA TRANSMISIÓN POSIBLE?

EL **95%** PIENSA QUE EL COVID-19 ES TRANSMITIDO DE PERSONA A PERSONA



EL **93%** PIENSA QUE UNA PERSONA ASINTOMÁTICA PUEDE TRANSMITIR EL VIRUS



EL **93%** PIENSA QUE UN PACIENTE CON COVID-19 PUEDE CURARSE



EL **98%** PIENSA QUE EL COVID-19 PUEDE CAUSAR LA MUERTE



EL **56%** TIENE MIEDO DE MORIR A CAUSA DE COVID-19

EL **82%** PIENSA QUE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (EJ: TAPABOCAS, GUANTES, DESINTECTANTES) SON CAPACES DE PREVENIR EL CONTAGIO



EL **92%** USAN MEDIDAS PREVENTIVAS (EJ: TAPABOCAS, GUANTES, DESINTECTANTES) PARA PREVENIR EL CONTAGIO

1) DESINFECTANTE

2) TAPABOCAS

3) GUANTES


EL **38%** SON OPTIMISTAS ACERCA DE ENCONTRAR RAPIDAMENTE UNA SOLUCIÓN





MIEDOS Y HÁBITOS

EL 85% TIENE TEMOR A INFECTAR A OTRAS PERSONAS



EL 78% TIENE TEMOR A INFECTARSE COVID-19

EL 91% ESTÁN PREOCUPADOS ACERCA DEL CONTACTO FÍSICO CON OTRAS PERSONAS

EL 100% DECLARÓ QUE SU PAÍS IMPUSO RESTRICCIONES PARA LA VIDA DIARIA Y PARA VIAJAR



EL 82% LE TIENE MIEDO A VIAJAR

EL 93% REDUJO SUS VIAJES

EL 74% ESTÁN PREOCUPADOS ACERCA DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA CUARENTENA



EL 44% PIENSA QUE ALGUNAS COSAS REDUCEN EL MIEDO Y LA PREOCUPACIÓN ACERCA DEL COVID-19

- 1 24% Parientes
- 2 21% Recomendaciones de autoridades nacionales e internacionales
- 3 7% Psicólogos
- 4 5% Amigos
- 5 2% Asociaciones de pacientes
2% Consultas médicas

39% No hay respuesta



67% SIENTEN EL AISLAMIENTO SOCIAL

EL 56% NO ESTÁN PREOCUPADOS DE ESTAR EN CUARENTENA



EL 100% PIENSA QUE LA CUARENTENA ES IMPORTANTE PARA PREVENIR CONTAGIOS

EL 89% SE COMPROMETIÓ A HACER CUARENTENA VOLUNTARIA


EL 98% REDUJO SUS HÁBITOS DIARIOS (EJ: IR AL SUPERMERCADO, RESTAURANTES, ETC)






ACCESIBILIDAD MÉDICA

¿HA TENIDO USTED PROBLEMAS PARA CONTACTAR A SU MÉDICO DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA DE COVID-19?



¿SU MÉDICO LE HA DADO INFORMACIÓN ACERCA DEL COVID-19?



EL 87% TIENE MIEDO DE IR A UN HOSPITAL/ CENTRO MÉDICO PARA TENER UNA CONSULTA GASTROINTESTINAL DEBIDO AL COVID-19

EL 67% SE SIENTE ESTRESADO DEBIDO A ESTA SITUACIÓN

EL 60% PIENSA QUE EL ESTRÉS PUEDE EMPEORAR LOS SÍNTOMAS DEL COVID-19




La mayoría de los encuestados temen llegar a los centros de salud, pero tampoco tienen problemas para comunicarse con su médico si es necesario.






RECOMENTACIONES MÉDICAS


¿SU MÉDICO LE HA DADO RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON SU EII (DROGAS, CONTACTO, ETC) DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19?



¿HAY ALGUNA RECOMENDACIÓN ADICIONAL SOBRE EL COVID-19 QUE LE GUSTARÍA DE SU MÉDICO?



SI USTED RECIVIÓ RECOMMENDACIONES, ESTÁ USTED SATISFECHO SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SU MÉDICO LE BRINDÓ?




Casi la mitad de los encuestados recibió recomendaciones del médico y 1/3 de los encuestados desearía recibir más información adicional relacionada con la EII.






MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES Y COVID-19

¿LOS MEDICAMENTOS INMUNOSUPRESORES PREDISPONEN A LA INFECCIÓN DE COVID-19?



¿ESTÁ USTED PREOCUPADO DE QUE SU MEDICACIÓN INCREMENTE EL RIESGO DE CONTRAER COVID-19?



EL 98% DE LOS MÉDICOS NO RECOMIENDA DEJAR DE TOMAR MEDICAMENTOS PARA EII DEBIDO AL COVID-19

AL 92% NO LE GUSTARÍA QUE LOS MEDICAMENTOS PARA EII SEAN DESCONTINUADOS DURANTE ESTE PERÍODO

EL 98% NO HA DETENIDO SU CONSUMO DE MEDICAMENTOS POR INICIATIVA PROPIA DEBIDO A PREOCUPACIONES




La mayoría de los encuestados piensa que los medicamentos inmunosupresores pueden predisponer a la infección por COVID-19. La mitad de los encuestados declararon temer que tomar medicamentos pueda aumentar el riesgo de COVID-19, pero casi la totalidad de los encuestados siguen estrictamente las indicaciones del especialista de no abandonar la terapia.






ENFERMEDADES POCO FRECUENTES Y COVID-19


¿LAS EII PREDISPONEN A CONTRAER COVID-19?



¿DEBERÍA CONTROLARSE EL COVID-19 EN PERSONAS ASINTOMÁTICAS CON EII?



¿EL COVID-19 EMPEORA LA EII?



La mitad de los encuestados no están seguros si la EII predispone a contraer COVID-19, y 2/3 de los encuestados no saben si el virus puede empeorar la EII. A la mitad de los encuestados les gustaría que las personas asintomáticas que además tengan EII sean controladas.



RESULTADOS GENERALES

Los resultados de esta encuesta fueron publicados en “The Lancet”. Aquí los resultados:

“Los resultados de esta encuesta resaltan que todavía existe una brecha entre médicos y pacientes. Existe una necesidad urgente de mejorar la comunicación médico-paciente y proporcionar recomendaciones claras y específicas en un período de confusión sustancial para las personas con enfermedades crónicas.

La Organización Europea de Crohn y Colitis, la Sociedad Británica de Gastroenterología y la Organización Internacional para el Estudio de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales han respondido a esta solicitud, proporcionando pautas prácticas para el tratamiento de pacientes con EII durante la pandemia, centrándose no sólo en el tratamiento farmacológico si no también en consejos para la vida diaria (por ejemplo, distanciamiento social, uso de máscaras y evitación de viajes). En pacientes con EII que no tienen síntomas sugestivos de COVID-19, los medicamentos inmunosupresores y biológicos no deben suspenderse como estrategia preventiva, ya que no hay evidencia hasta la fecha que sugiera que existe un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 con estas terapias.

Además, se recomienda a los pacientes que se queden en casa, eviten viajar, respeten las reglas de distanciamiento social (al menos 1 metro entre una persona y otra), presten mucha atención a la higiene de las manos y usen máscaras protectoras fuera del hogar. En este contexto, las asociaciones de pacientes son un vínculo clave entre médicos y pacientes y deberían participar cada vez más en el manejo del paciente. La estrecha cooperación podría permitir un mayor cumplimiento del paciente con las recomendaciones de los proveedores de atención médica y también podría ayudar a establecer relaciones duraderas y de confianza”.

EFCCA quiere agradecer a los
participantes y asociaciones nacionales
por ser parte de esta encuesta.

EFCCA Contactos

Rue des Chartreux 33-35
B -1000 Brussels Belgium
Tel/Fax: +32 2 540 8434

En Argentina con la colaboración de:



Email: info@masvida.org.ar
Tel: 0800 222 0614
www.masvida.org.ar

