

COMPARACION DE LAS CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS ENTRE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL DIAGNOSTICADOS ANTES O DESPUÉS DE LOS 6 AÑOS DE VIDA

Costaguta Alejandro, Romero Andrea, Tabacco Omar. Sanatorio de Niños. Rosario, Santa Fe, Argentina

INTRODUCCIÓN:

- La enfermedad intestinal inflamatoria pediátrica (EIIP) es una enfermedad crónica, difícil de predecir
- Los menores de 6 años al momento del diagnóstico constituyen un grupo especial conocido como VEOD (*Very Early Onset Disease*)
- Estos niños podrían presentar una evolución más tórpida que sus contrapartes de edades mayores al diagnóstico

OBJETIVO:

- Comparar las diferencias evolutivas en el mediano plazo entre los pacientes diagnosticados antes o después de los 6 años de vida

Fig.1: Necesidad de cirugía





Fig.2: Uso de biológicos




MATERIAL Y MÉTODOS:

- Estudio observacional, retrospectivo
- Todos los pacientes diagnosticados como EIIP atendidos en el Sanatorio de Niños de Rosario
- Período 2009-2019
- Los pacientes se analizaron en 2 grupos diferentes según la edad al momento del diagnóstico: "VEOD" (< 6 años) y "No VEOD" (> 6 años)
- Las variables analizadas fueron: "Necesidad de cirugía", "Uso de biológicos" y "Desarrollo de hepatopatía"
- Para la comparación entre grupos se utilizó el test de chi-cuadrado. Una $p < 0.05$ se consideró significativa

RESULTADOS:

- Total de pacientes: 62 (F=35)
- VEOD = 23 pacientes
- No VEOD = 39 pacientes
- **No se observaron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a las variables analizadas (Fig. 1-3)**

Fig.3: Desarrollo de hepatopatía



CONCLUSIÓN:

- En el presente estudio no encontramos diferencias en la evolución a mediano plazo entre los pacientes diagnosticados antes o después de los 6 años de vida
- Un estudio con mayor tamaño muestral y análisis de supervivencia sería apropiado para confirmar o refutar esta observación